Mathématiques MAT 432
Analyse de Fourier et théorie spectrale

Feuille d'exercices numéro 3 - 17 septembre 2004
Séries de Fourier et transformation de Fourier dans L^1

Exercice 1. Développements en demi-période

1. Soit $L > 0$. Montrer que les fonctions $\varphi_p(t) = \cos(\frac{p\pi}{L}t)$, $p \geq 0$, forment un système total de $L^2(0, L)$.
2. Soit $L > 0$. Montrer que les fonctions $\varphi_p(t) = \sin(\frac{p\pi}{L}t)$, $p \geq 1$, forment un système total de $L^2(0, L)$.
3. Calculer les coefficients a_n tels que $1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(nx)$ dans $L^2(0, \pi)$. En déduire que

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

Exercice 2. Développements en quart de période

1. Soit $L > 0$. Montrer que les fonctions $\varphi_p(t) = \cos(\frac{(2p+1)\pi}{2L}t)$, $p \geq 0$, forment un système total de $L^2(0, L)$. Pour $f \in L^2(0, L)$, on considérera la fonction

$$g(t) = \begin{cases} f(t) \text{ pour } 0 < t < L \\ -f(2L - t) \text{ pour } L < t < 2L \\ g(-t) \text{ pour } -2L < t < 0. \end{cases}$$

2. Soit $L > 0$. Montrer que les fonctions $\varphi_p(t) = \sin(\frac{(2p+1)\pi}{2L}t)$, $p \geq 0$, forment un système total de $L^2(0, L)$. Pour $f \in L^2(0, L)$, on considérera la fonction

$$g(t) = \begin{cases} f(t) \text{ pour } 0 < t < L \\ f(2L - t) \text{ pour } L < t < 2L \\ -g(-t) \text{ pour } -2L < t < 0. \end{cases}$$

Exercice 3. Décroissance des coefficients de Fourier

1. Montrer que pour toute fonction $f \in L^1(0, 2\pi)$, on a la relation

$$\lim_{|n|\to\infty} c_n(f) = 0,$$

où $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-inx} f(x)dx$.

2. Soit f une fonction de classe C^k sur $\mathbb{R}$, 2π-périodique. Montrer que

$$\lim_{|n|\to\infty} n^k c_n(f) = 0. \tag{1}$$

3. Soit $k \geq 2$ et f une fonction continue sur $\mathbb{R}$, 2π-périodique et vérifiant (1). Montrer que la fonction f est C^{k-2} sur $\mathbb{R}$. La fonction f est-elle C^k sur $\mathbb{R}$?
4. Soit f une fonction holomorphe dans la bande $\{z \in \mathbb{C};\ |\mathrm{Im} z| < C_0\}$ et 2π-périodique ($C_0 > 0$ est fixé). Montrer que

$$\forall C < C_0, \quad \lim_{|n| \to \infty} e^{C|n|} c_n(f) = 0. \tag{2}$$

5. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$, 2π-périodique et vérifiant (2). Montrer que la fonction f est holomorphe sur $\{z \in \mathbb{C};\ |\mathrm{Im} z| < C_0\}$.
6. Soit f une fonction de classe C^1 sur $[0, 2\pi]$ mais telle que $f(2\pi) \neq f(0)$. Montrer qu'alors $c_k(f) = 0(\frac{1}{k})$. Estimer le reste de la série de Fourier (en norme L^2).
7. Faire les mêmes calculs que dans les deux questions précédentes, mais en considérant les coefficients de f sur la base en cosinus,

$$c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos\left(\frac{kx}{2}\right) f(x) dx.$$

8. Faire les mêmes calculs pour les coefficients de Fourier $c_{k,l}$ d'une "image", c'est-à-dire une fonction $f(x, y)$ définie sur un carré $[0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$, de classe C^2 et dont la $(2\pi \times 2\pi)$-périodisée a des discontinuités sur le bord du carré. En déduire pourquoi la technologie actuelle préfère la "transformée en cosinus" pour coder les images de télévision.

Exercice 4. Convolution dans l'espace des fonctions périodiques

1. On note E l'espace des fonctions sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ qui sont 2π-périodiques et intégrables sur $[-\pi, \pi]$. On munit E de la norme $||f||_1 := \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)| dx$. Pour $f \in E$ et $g \in E$, et $x \in \mathbb{R}$ on pose $f *_{S^1} g(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(y) g(x - y) dy$. Montrer que $f *_{S^1} g$ ainsi définie appartient à E .
2. On appelle polynôme trigonométrique toute expression de la forme

$$P(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{ikt}$$

où les a_k sont des nombres complexes.
Montrer que, si P est un polynôme trigonométrique, pour $f \in E$, la fonction $f *_{S^1} P$ en est également un.
3. Démontrer que si $f, g \in L^2(-\pi, \pi)$, alors $f *_{S^1} g$ est bornée et $c_n(f *_{S^1} g) = 2\pi c_n(f) c_n(g)$.
4. En déduire que la série de Fourier de $f *_{S^1} g$ est uniformément convergente.
5. Montrer que $f *_{S^1} g$ est continue et en déduire que c'est la somme de sa série de Fourier.

Exercice 5. Soient $a > 0$, $b > 0$ et $c \in \mathbb{R}$.
Calculer les transformées de Fourier des fonctions de $L^1(\mathbb{R})$ suivantes :

$$x \mapsto \frac{1}{2a} \mathbf{1}_{[c-a, c+a]}(x), \quad x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} e^{\frac{-x^2}{2a}}, \quad x \mapsto e^{-a|x|}, \quad x \mapsto |x| e^{-a|x|}, \quad \text{et} \quad x \mapsto \frac{2a}{x^2 + a^2}.$$

Exercice 6. Calculer les transformées de Fourier des fonctions de $L^1(\mathbb{R}^2)$:

$$(x,y) \mapsto e^{-(x^2+2y^2)}, \quad (x,y) \mapsto e^{-(x^2+y^2+xy)} \quad \text{et} \quad X := (x,y) \mapsto e^{-\frac{1}{2}({}^tXAX)},$$

où A est une matrice symétrique définie positive.

Exercice 7. Calculer la transformée de Fourier de la fonction indicatrice de la boule unité euclidienne de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 8. Rappelons que, pour $n \geq 0$, le n-ième polynôme d'Hermite H_n est défini par la relation $\dfrac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2}) = (-1)^n H_n e^{-x^2}$; de plus, ils satisfont aux relations

$$H_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 1, \quad H_{n+1} = \left(-\frac{d}{dx} + 2x\right) H_n.$$

Les fonctions d'Hermite ψ_n sont définies par $\psi_n = c_n H_n e^{\frac{-x^2}{2}}$ où $c_n = (\sqrt{\pi} 2^n n!)^{-\frac{1}{2}}$.

1. Montrer que

$$\left(\frac{d}{dx} + x\right) \psi_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 1, \quad \left(-\frac{d}{dx} + x\right) \psi_n = \sqrt{2(n+1)}\psi_{n+1}.$$

2. En déduire les égalités $\widehat{\psi_n} = (-i)^n \sqrt{2\pi}\psi_n$.
3. Montrer que $\{\psi_n;\ n \geq 0\}$ forme un système orthonormal dans $L^2(\mathbb{R})$. Pour calculer $(\psi_p|\psi_q)$, on pourra intégrer par parties p (ou q) fois.
4. Soit g une fonction de $L^2(\mathbb{R})$. On pose, pour $\zeta \in \mathbb{C}$,

$$G(\zeta) \ = \ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\zeta} e^{-\frac{x^2}{2}} g(x)\, dx.$$

   Montrer que la fonction G est une fonction holomorphe de la variable ζ et calculer $\dfrac{d^k G}{d\zeta^k}(0)$.
5. En déduire que la famille $\{\psi_n;\ n \geq 0\}$ est une base de $L^2(\mathbb{R})$.