

TD n°8 Solutions  
*Couplage de moments cinétiques et applications*

## 1 Couplage de deux spins 1/2 : $\mathcal{D}_{J=1/2} \otimes \mathcal{D}_{J=1/2} = \mathcal{D}_{J=0} \oplus \mathcal{D}_{J=1}$

**C'est un exercice de cours.** Voir aussi la réf. : [1], chap. X, p.1006.

1. On considère une particule 1 (respect. 2) de spin 1/2, décrit par un vecteur dans l'espace de Hilbert  $\mathcal{H}_1$ , de base  $|+1\rangle, |-1\rangle$  (respect.  $\mathcal{H}_2$ , de base  $|+2\rangle, |-2\rangle$ ). Une base orthonormée de l'espace total  $\mathcal{H}_{tot.} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$  est donc donnée par les 4 vecteurs

$$(|+1, +2\rangle, |+1, -2\rangle, |-1, +2\rangle, |-1, -2\rangle)$$

Remarque : on note  $|+1, +2\rangle \equiv |+1\rangle \otimes |+2\rangle$ , etc...

2. On note  $\vec{S}_1 = (S_{1,x}, S_{1,y}, S_{1,z})$  les opérateurs de spin de la particule 1, et de même  $\vec{S}_2$  pour la particule 2. L'opérateur de rotation d'un angle  $\alpha$  autour de l'axe  $\vec{u}$  du système total s'écrit :

$$\hat{R}_{\vec{u}}(\alpha) = \hat{R}_{(1),\vec{u}}(\alpha) \otimes \hat{R}_{(2),\vec{u}}(\alpha)$$

avec

$$\hat{R}_{(1),\vec{u}}(\alpha) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\alpha\vec{S}_1 \cdot \vec{u}\right), \quad \hat{R}_{(2),\vec{u}}(\alpha) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\alpha\vec{S}_2 \cdot \vec{u}\right)$$

On déduit que  $\hat{R}_{\vec{u}}(\alpha) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\alpha(\vec{S}_1 + \vec{S}_2) \cdot \vec{u}\right) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\alpha\vec{S} \cdot \vec{u}\right)$  est générée par  $\vec{S} = (\vec{S}_1 + \vec{S}_2)$ . On vérifie que ces opérateurs forment l'algèbre du moment cinétique en écrivant  $[S_x, S_y] = [(S_{1,x} + S_{2,x}), (S_{1,y} + S_{2,y})] = S_{1,z} + S_{2,z} = S_z$ , etc...

3. On veut décomposer l'espace total  $\mathcal{H}_{tot.} = \mathcal{D}_{1/2} \otimes \mathcal{D}_{1/2}$  en représentation irréductibles des rotations du système total, générées par  $\vec{S}$ . Autrement dit, on cherche une base de vecteurs  $|J, M\rangle$  (à exprimer dans la base de départ), vérifiant :

$$\hat{S}_z|J, M\rangle = M\hbar|J, M\rangle, \quad \vec{S}^2|J, M\rangle = \hbar^2 J(J+1)|J, M\rangle$$

On écrit :  $\vec{S}^2 = (\vec{S}_1 + \vec{S}_2)^2 = \vec{S}_1^2 + \vec{S}_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$ . Et

$$\begin{aligned} \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 &= (\hat{S}_{1,x}\hat{S}_{2,x} + \hat{S}_{1,y}\hat{S}_{2,y} + \hat{S}_{1,z}\hat{S}_{2,z}) \\ &= \left(\frac{1}{2}\hat{S}_{1,+}\hat{S}_{2,-} + \frac{1}{2}\hat{S}_{1,-}\hat{S}_{2,+} + \hat{S}_{1,z}\hat{S}_{2,z}\right) \end{aligned}$$

avec  $S_{\pm} = S_x \pm iS_y$ . Donc

$$\begin{aligned} \hat{S}^2 &= \hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 \\ &= \hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + \left(\hat{S}_{1,+}\hat{S}_{2,-} + \hat{S}_{1,-}\hat{S}_{2,+} + 2\hat{S}_{1,z}\hat{S}_{2,z}\right) \end{aligned}$$

4. On va aussi utiliser :

$$\begin{aligned} \hat{S}_1^2|-\rangle &= \hbar^2 \frac{3}{4}|-\rangle \\ \hat{S}_{1,+}|-\rangle &= \hbar|+\rangle \\ \hat{S}_{1,-}|-\rangle &= 0 \\ \hat{S}_{1,z}|\pm\rangle &= \pm \frac{\hbar}{2}|\pm\rangle \end{aligned}$$

On calcule :

$$\hat{S}_z |--\rangle = (-1)\hbar |--\rangle$$

$$\hat{S}^2 |--\rangle = \hbar^2 \left( \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + 2\frac{1}{4} \right) |--\rangle = 2\hbar^2 |--\rangle$$

donc :

$$|--\rangle = |J=1, M=-1\rangle$$

Ensuite, on crée  $|J=1, M=0\rangle$  par action de  $\hat{S}_+$  :

$$|J=1, M=0\rangle = \frac{1}{\hbar\sqrt{2}} \hat{S}_+ |J=1; M=-1\rangle = \frac{1}{\hbar\sqrt{2}} (\hat{S}_{1,+} + \hat{S}_{2,+}) |--\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle + |-+\rangle)$$

et on crée  $|J=1, M=1\rangle$  par action à nouveau de  $\hat{S}_+$  :

$$|J=1, M=1\rangle = \frac{1}{\hbar\sqrt{2}} \hat{S}_+ |J=1; M=0\rangle = \frac{1}{\hbar\sqrt{2}} (\hat{S}_{1,+} + \hat{S}_{2,+}) \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle + |-+\rangle)$$

$$= \frac{1}{2} (|++\rangle + |++\rangle) = |++\rangle$$

On a donc obtenu trois vecteurs  $|J=1, M=-1, 0, +1\rangle$  de l'espace  $\mathcal{H}_{tot}$  qui lui est de dimension 4. Le complémentaire orthogonal est de dimension 1, et engendré par le vecteur :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle - |-+\rangle)$$

on calcule de même :

$$\hat{S}^2 |\psi\rangle = \dots = 0, \quad \hat{S}_z |\psi\rangle = 0$$

donc  $|\psi\rangle = |J=0, M=0\rangle$ .

En résumé, voici la décomposition de l'espace  $\mathcal{H}_{tot}$  en vecteurs  $|J, M\rangle$  orthonormés :

$$\text{Triplet} : \begin{cases} |J=1; M=+1\rangle & = |++\rangle \\ |J=1; M=0\rangle & = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle + |-+\rangle) \\ |J=1; M=-1\rangle & = |--\rangle \end{cases}$$

$$\text{Singlet} : |J=0; M=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle - |-+\rangle)$$

Montrant que l'espace  $\mathcal{H}_{tot} = \mathcal{D}_{1/2} \otimes \mathcal{D}_{1/2}$  se décompose en somme deux représentations irréductibles du groupe de rotation :

$$\mathcal{D}_{1/2} \otimes \mathcal{D}_{1/2} = \mathcal{D}_{J=1} \oplus \mathcal{D}_{J=0} \quad (1)$$

Les dimensions de ces espaces sont :  $2 \times 2 = 3 + 1$ .

Remarquer que les valeurs de  $J$  possibles de la particule composée sont la somme  $J = |\frac{1}{2} + \frac{1}{2}| = 1$  et la différence  $J = |\frac{1}{2} - \frac{1}{2}| = 0$  des deux spins  $\frac{1}{2}$  individuels. Les coefficients devant les états  $|\pm, \pm\rangle$  dans les expressions des états triplets et singlet ci-dessus, s'appellent **coefficients de Clebsch-Gordan**.

## 2 Structure hyperfine des atomes

(Suite de l'exercice (1)). Réf. : [1], chap. XII-D, p.1217.

1. Comme en algèbre vectorielle, il semble assez clair que le produit scalaire  $\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$  est invariant par rotation de l'ensemble. (En physique, on dit que c'est un "opérateur scalaire"). Pour être

plus précis, pour montrer l'invariance par rotation, il faut montrer  $[\hat{H}, \vec{S}] = 0$ . On a vu que  $\vec{S}^2 = \vec{S}_1^2 + \vec{S}_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$ . On déduit que

$$\begin{aligned}\hat{H} &= A\hat{I} + B\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \\ &= A\hat{I} + \frac{B}{2} \left( \hat{S}^2 - \hat{S}_1^2 - \hat{S}_2^2 \right) \\ &= A\hat{I} + \frac{B}{2} \left( \hat{S}^2 - \hbar^2 \frac{3}{2} I \right)\end{aligned}$$

On a utilisé le fait que sur  $\mathcal{H}_{tot}$ ,  $\hat{S}_1^2 \equiv \hbar^2 \frac{3}{4} I$ ,  $\hat{S}_2^2 \equiv \hbar^2 \frac{3}{4} I$  (car pour  $j = 1/2$  alors  $j(j+1) = 3/2$ ). Or  $[\hat{S}^2, \vec{S}] = 0$  donc  $[\hat{H}, \vec{S}] = 0$ .

2. Ensuite, on a  $\hat{S}^2 |J, M\rangle = \hbar^2 J(J+1) |J, M\rangle$ , on déduit que

$$\begin{aligned}\hat{H} |J=0, M\rangle &= E_0 |J=0, M\rangle, & M=0 \\ \hat{H} |J=1, M\rangle &= E_1 |J=1, M\rangle, & M=-1, 0, +1\end{aligned}$$

avec

$$E_J = A + \frac{B}{2} \hbar^2 \left( J(J+1) - \frac{3}{2} \right)$$

soit :

$$E_0 = A - \frac{3}{4} B \hbar^2, \quad E_1 = A + \frac{1}{4} B \hbar^2$$

c.a.d. que  $\hat{H}$  a deux niveaux d'énergie,  $E_{J=0}, E_{J=1}$  de multiplicité respectives 1, 3. Par conséquent, dans son état d'énergie fondamentale, la particule composée est une particule de moment angulaire intrinsèque  $J=0$ . Dans son état excité elle a un moment angulaire intrinsèque  $J=1$ .

3. On écrit  $\Delta E = h\nu$  et  $\lambda = \frac{c}{\nu} = 21$  cm. Donc  $\Delta E = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} = 6.10^{-6} eV$ . Or  $\Delta E = E_1 - E_0 = \frac{7}{4} B \hbar^2$ , donc

$$B = \frac{4}{7} \frac{\Delta E}{\hbar^2}$$

4.  $\nu = 9192631770$ , donnant  $\Delta E = h\nu = 3.8 \cdot 10^{-5} eV$ .

5. On a vu que  $\mathcal{D}_{1/2} \otimes \mathcal{D}_{1/2} = \mathcal{D}_0 \oplus \mathcal{D}_1$ . Si  $\hat{H}$  est un opérateur vérifiant  $[\hat{H}, \vec{S}] = 0$  (invariance par rotation) alors d'après le **Lemme de Shur**,  $\hat{H}$  exprimé dans la décomposition  $\mathcal{D}_0 \oplus \mathcal{D}_1$  est de la forme bloc:

$$\hat{H} = \left( \begin{array}{cc} \lambda \hat{I} & 0 \\ \underbrace{0}_{\mathcal{D}_0} & \underbrace{\mu \hat{I}}_{\mathcal{D}_1} \end{array} \right), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Or on a vu que l'opérateur  $A\hat{I} + B\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = A + \frac{B}{2} \hbar^2 \left( J(J+1) - \frac{3}{2} \right)$  s'exprime dans cette même décomposition par

$$\left( \begin{array}{cc} E_0 = A - \frac{3}{4} B \hbar^2 & 0 \\ 0 & E_1 = A + \frac{1}{4} B \hbar^2 \end{array} \right)$$

Il suffit donc de prendre  $A, B$  tels que  $A - \frac{3}{4} B \hbar^2 = \lambda$  et  $\mu = A + \frac{1}{4} B \hbar^2$ .

Plus généralement, pour le couplage  $\mathcal{D}_{j_1} \otimes \mathcal{D}_{j_2} = \bigoplus_{j=|j_2-j_1|}^{j_1+j_2} \mathcal{D}_j$ , un opérateur invariant s'exprime comme  $\lambda_j \hat{I}$  sur chaque espace  $\mathcal{D}_j$  de la décomposition. Il y a donc  $N = j_2 + j_1 - |j_2 - j_1|$  paramètres indépendant  $\lambda_j$ . Comme l'opérateur de Casimir  $\vec{S}^2$  est  $\hbar^2 j(j+1) \hat{I}$  sur

un espace  $\mathcal{D}_j$  (et distingue donc les espaces  $\mathcal{D}_j$ ) on déduit que un opérateur invariant peut s'exprimer sous la forme  $\hat{H} = \mu_0 \hat{I} + \mu_1 \vec{S}^2 + \mu_2 (\vec{S}^2)^2 + \dots + \mu_{N-1} (\vec{S}^2)^{N-1}$ . Il est possible de relier les  $(\mu_j)_j$  et les  $(\lambda_j)_j$ . De façon équivalente on pourrait utiliser  $(\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2)^k$  à la place de  $(\vec{S}^2)^k$ , les coefficients seraient différents.

### 3 Couplage $\mathcal{D}_{J=1} \otimes \mathcal{D}_{J=1/2}$ . Symétrie d'isospin et diffusion pion-nucléon

1. On a  $\mathcal{D}_{j=1} \otimes \mathcal{D}_{j=1/2} = \mathcal{D}_{j=1/2} \oplus \mathcal{D}_{j=3/2}$ , de dimensions  $3 \times 2 = 2 + 4 = 6$  (d'après  $\dim \mathcal{D}_j = 2j + 1$ ).
2. En utilisant la table, et les correspondances  $|p\rangle = |j_2 = \frac{1}{2}, m_2 = \frac{1}{2}\rangle$ ,  $|\pi^+\rangle = |j_1 = 1, m_1 = 1\rangle$  etc.., on obtient :

$$\begin{aligned} |p\pi^+\rangle &= \left| \frac{3}{2}; \frac{3}{2} \right\rangle, & |p\pi^0\rangle &= \sqrt{2/3} \left| \frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{1/3} \left| \frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right\rangle \\ |p\pi^-\rangle &= \sqrt{1/3} \left| \frac{3}{2}; -\frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{2/3} \left| \frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \right\rangle, & |n\pi^+\rangle &= \sqrt{1/3} \left| \frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{2/3} \left| \frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right\rangle \\ |n\pi^0\rangle &= \sqrt{2/3} \left| \frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{1/3} \left| \frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \right\rangle, & |n\pi^-\rangle &= \left| \frac{3}{2}; -\frac{3}{2} \right\rangle \end{aligned}$$

3. D'après le Lemme de Shur, dans un espace de représentation irréductible, un opérateur invariant  $\hat{U}$  doit agir comme l'identité à une constante complexe près. De plus il est nul entre des espaces irréductibles différents. Donc dans la décomposition  $\mathcal{D}_{j=1/2} \oplus \mathcal{D}_{j=3/2}$  :

$$\hat{U} \equiv_{\mathcal{D}_{3/2} \oplus \mathcal{D}_{1/2}} \begin{pmatrix} A_{3/2} \hat{I}_4 & 0 \\ 0 & A_{1/2} \hat{I}_2 \end{pmatrix}$$

avec  $A_{3/2}, A_{1/2} \in \mathbb{C}$ .

4. on obtient :

$$\begin{aligned} \sigma(p\pi^+ \rightarrow p\pi^+) &= \left| \langle p, \pi^+ | \hat{U} | p, \pi^+ \rangle \right|^2 = |A_{3/2}|^2 \\ \sigma(p\pi^- \rightarrow n\pi^0) &= \left| \langle n, \pi^0 | \hat{U} | p, \pi^- \rangle \right|^2 = \left| \frac{\sqrt{2}}{3} A_{3/2} - \frac{\sqrt{2}}{3} A_{1/2} \right|^2 \\ \sigma(p\pi^- \rightarrow p\pi^-) &= \left| \langle p, \pi^- | \hat{U} | p, \pi^- \rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{3} A_{3/2} + \frac{2}{3} A_{1/2} \right|^2 \end{aligned}$$

- (a) si  $|A_{3/2}| \gg |A_{1/2}|$ , alors  $\sigma(p\pi^+ \rightarrow p\pi^+) = |A_{3/2}|^2$ ,  $\sigma(p\pi^- \rightarrow n\pi^0) \simeq \frac{2}{9} |A_{3/2}|^2$ ,  $\sigma(p\pi^- \rightarrow p\pi^-) \simeq \frac{1}{9} |A_{3/2}|^2$ .
- (b) si  $|A_{3/2}| \ll |A_{1/2}|$ , alors  $\sigma(p\pi^+ \rightarrow p\pi^+) \simeq 0$ ,  $\sigma(p\pi^- \rightarrow n\pi^0) \simeq \frac{2}{9} |A_{1/2}|^2$ ,  $\sigma(p\pi^- \rightarrow p\pi^-) \simeq \frac{4}{9} |A_{1/2}|^2$ .
- (c) si  $A_{3/2} = A_{1/2}$ , alors  $\sigma(p\pi^+ \rightarrow p\pi^+) = |A_{3/2}|^2$ ,  $\sigma(p\pi^- \rightarrow n\pi^0) \simeq 0$ ,  $\sigma(p\pi^- \rightarrow p\pi^-) \simeq |A_{3/2}|^2$ .

5. L'expérience donne :

$$\begin{aligned} \frac{\sigma(p\pi^+ \rightarrow p\pi^+)}{\sigma(p\pi^- \rightarrow n\pi^0)} &= 4.33 \simeq 4.5 \\ \frac{\sigma(p\pi^+ \rightarrow p\pi^+)}{\sigma(p\pi^- \rightarrow p\pi^-)} &= 8.47 \simeq 9 \end{aligned}$$

On est donc proche de la situation  $|A_{3/2}| \gg |A_{1/2}|$ .

6. Durée de vie  $\tau \simeq \frac{\hbar}{\Delta E} = 6.510^{-24} s$ . L'espace de degré interne d'isospin de cette particule  $\Delta$  est  $\mathcal{D}_{j=3/2}$ , de dimension  $2j + 1 = 4$ . D'après l'écriture  $|j = 3/2, m = 3/2\rangle = |p^+, \pi^+\rangle$ , etc... on déduit que  $|\Delta^{++}\rangle = |j = 3/2; m = 3/2\rangle$ ,  $|\Delta^+\rangle = |j = 3/2; m = 1/2\rangle$ ,  $|\Delta^0\rangle = |j = 3/2; m = -1/2\rangle$ ,  $|\Delta^-\rangle = |j = 3/2; m = -3/2\rangle$ .

## Références

- [1] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloe. *Mécanique quantique*.